Alfred Clarence Redfield (1890 – 1983). Physiologiste et océanographe américain. Professeur à l'Université de Harvard. Un des premiers membres du Woods Hole Marine Biological Laboratory, fondé en 1930, où il fit toute sa carrière de chercheur, jusqu'en 1970.

Le concept de Redfield

En 1934, Redfield avait observé que, quelles que soient les concentrations, il existait un rapport sensiblement constant entre le contenu en nitrate et en phosphate des eaux de mer, que ces éléments étaient apparemment extraits du milieu ambiant par le plancton dans les proportions où ils se trouvaient et qu'ils retournaient en solution simultanément à la mort des organismes.

Ces vues se trouvaient confortées et précisées en 1940, par les analyses de plancton réalisées par Flemming, analyses montrant que le plancton marin possédait un rapport C/N/P voisin de 106/16/1.

Mais c'est surtout un article publié en 1963 par Redfield, Ketchum et Richards qui a contribué à populariser le *concept de Redfield* dans la communauté des océanographes.

Selon les vues de Redfield, la photosynthèse (ou la décomposition) du plancton produit (ou consomme) 138 moles de O₂ par mole de P, selon le bilan réactionnel :

Rapports entre P, N, C et O₂ dans les eaux de mer

L'activité biologique des organismes doit donc modifier la teneur en oxygène, en carbone inorganique, en azote et en phosphore des eaux de mer selon les proportions :

$$\Delta P / \Delta N / \Delta C / \Delta O_2 = 1 / 16 / 106 / - 138$$

A la lumière des innombrables mesures de phosphate, de nitrate et d'oxygène qui ont été réalisées dans les 30 dernières années, il apparaît que les rapports de Redfield seraient quelque peu différents des valeurs initialement proposées par l'auteur, ce qui n'enlève rien à l'intérêt du concept.

Le rapport entre phosphate et nitrate étant le même dans l'eau de mer et dans le plancton, soit N / P ≈ 16, il s'ensuit que le prélèvement ou la restitution de nutriments dans un rapport ΔN / ΔP ≈ 16 ne modifient pas la valeur de ce rapport. Les données océanographiques font clairement apparaître une relation linéaire entre N et P, surtout si ces données sont nombreuses et couvrent un large domaine de concentrations, depuis les eaux superficielles pauvres, jusqu'aux eaux profondes (Fig. 1).

Fig. 1 – Diagramme nitrate-phosphate pour l'Ocan Mondial, d'aprs les donnes de l'Atlas de Levitus. De toute vidence, le rapport N / P serait plus prs de 15 que de 16. Figure prsente par Yool & Tyrrel, <http://www.soc.soton.ac.uk/GDD/bio/Yool/Diatoms/>

En ce qui concerne les rapports $\Delta O_2 / \Delta N / \Delta P$, c'est l'UAO, l'utilisation apparente de l'oxygne, qu'il convient de considrer.

Dans diffrentes masses d'eaux soumise aux effets de la dcomposition planctonique, on observe des relations linaires entre l'UAO et les teneurs en N ou en P. Mais ces droites ne passent pas ncessairement par l'origine des axes. Ces points limites d'UAO = 0 sont interprts comme reprsentant les caractristiques initiales des eaux, avant que la dgradation planctonique n'en ait modifi le contenu. Les valeurs de N ou de P l'origine sont appeles *azote prform* N_p ou *phosphore prform* P_p (Fig. 2).

FIG. 2 – Exemple de relation UAO-Nitrate

Les Ivrognes, ou le triomphe de Bacchus.
Velasquez, muse du Prado

- Qui feut premier, soif ou beuverye ?
- Soif, car qui eust beu sans soif durant le temps de innocence ?
- Beuverye, car "privatio presupponit habitum". Je suis clerc

*Les propos des bien yvres.
Gargantua Chap. V*

Qui fut premier ?

Le plancton s'est-il adapte au rapport N / P de l'eau de mer ou bien, par son activite poursuivie au fil des temps, est-il l'origine de ce rapport ?

C'est les deux la fois, car il s'agit d'une adaptation interactive du plancton son milieu.

Dans l'Ocan mondial l'tat stationnaire, il doit y avoir quilibre entre fixation d'azote molculaire et dnitrification. La fixation de N_2 est rgule par la comptition entre les espces qui sont incapables d'utiliser l'azote et celles qui en sont capables. En revanche le taux de dnitrification dpend de l'extension gographique des rgions anoxiques, donc, de la circulation ocanique gnrale. Si pour une raison quelconque, le rapport N / P venait diminuer dans l'ocan, les espces capables d'utiliser N_2 tireraient avantage de la situation. La captation d'azote augmenterait sans que pour autant le taux de dnitrification augmente. Il en rsulterait une accumulation du nitrate dans l'ocan et un rajustement la hausse du rapport N / P. Si, pour une raison quelconque, le rapport N / P venait augmenter, les organismes incapables de fixer N_2 seraient avantaes et le scnario inverse se produirait. Par contre, si par suite d'un bouleversement gologique ou climatique, la circulation ocanique gnrale venait changer, l'extension des zones de dnitrification serait modifie et l'ocan voluerait probablement vers un nouvel tat stationnaire avec un rapport N / P diffrent de celui existant actuellement.